



GHS07



GHS09

ПАЖЊА

## RESORT

фунгицид - средство за заштиту од гљивичних обољења  
концентрат за емулзију светло жуте боје (EC)

САСТАВ ПРЕПАРАТА (активна супстанца):

Генерички назив: protiokonazol  
Хемијски назив (IUPAC): (RS)-2-[2-(1-hlorciklopropil)-3-(2-hlorfenil)-2-hidroksipropil]-2,4-dihidro -  
1,2,4-triazol-3-tion  
Садржај: 125 ± 7,5 g/l  
Техничка чистоћа: min 97 %  
CAS број: 178928-70-6

Генерички назив: difenokonazol  
Хемијски назив (IUPAC): 3-hlor-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-  
dioksolan-2-il]fenil 4-hlorfenil etar  
Садржај: 75 ± 7,5 g/l  
Техничка чистоћа min: 94 %  
CAS број: 119446-68-3

### Пре примене средства за заштиту биља обавезно прочитати етикету!

#### ДЕЛОВАЊЕ

**RESORT** је системични фунгицид са протективним, куративним и ерадикативним деловањем за сузбијање проузроковача пепелнице пшенице (*Blumeriella graminis*), проузроковача рђа (*Puccinia spp.*), проузроковача сиве пегавости листа (*Mycosphaerella graminicola*) и проузроковача палежи класа стрних жита (*Fusarium spp.*) у усеву пшенице

#### ПРИМЕНА

**RESORT** се примењује у **усеву пшенице** за сузбијање проузроковача пепелнице пшенице (*Blumeriella graminis*) третирањем током фаза влатања, класања и цветања по појави симптома, а пре почетка ширења обољења на горња три листа укључујући заставичар и клас, за проузроковача рђа (*Puccinia spp.*) у влатању и класању до почетка цветања по појави симптома, пре и у току стицања услова за ширење обољења, за проузроковача сиве пегавости листа (*Mycosphaerella graminicola*) по појави симптома и стицања услова за ширење обољења и за проузроковача палежи класа стрних жита (*Fusarium spp.*) од краја класања (по појави свих класова) и почетком цветања (видљиве прве поленове кесе) у количини примене од 1 l/ha (10 ml на 100 m<sup>2</sup>) уз утршак воде: 200-400 l/ha (2-4 l на 100 m<sup>2</sup>).

**Начин примене:** Препарат се примењује фолијарно, прскањем или орошавањем, свим типовима уређаја за прскање и орошавање са земље. Максималан број третирања: Два пута на истој површини у току године са интервалом између два третирања од 10-14 дана. Третирање из ваздухоплова: Није дозвољено.

#### ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ТРЕТИРАЊЕ

Резервоар уређаја за примену напунити водом до пола и почети са мешањем. Улити одмерену количину препарата директно у резервоар. Допунити резервоар водом уз непрестано мешање. Са мешањем наставити током третирања.

#### МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ ПРЕПАРАТИМА

Може се мешати са другим фунгицидима и инсектицидима али би пре мешања требало проверити компатибилност мешањем мањих количина препарата.

## РЕЗИСТЕНТНОСТ

**RESORT** је системични фунгицид на бази активних материја protiokonazol и difenokonazol обе из исте групе triazola. Не примењивати га алтернативно са препаратима на бази triazola, као ни са једињењима истог механизма деловања. Према FRAC листи tebukonazol је сврстан у 3 групу (G1).

## ФИТОТОКСИЧНОСТ

Није фититоксичан, уколико се примењује према упутству произвођача.

## НАПОМЕНА

- Забрањена је примена средства за заштиту биља у водозащитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва.

### Негативно деловање средства за заштиту биља

**На водене организме:** Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама. Спречити доспевање средства за заштиту биља у воде и канализациону мрежу.

**На воде (контаминација):** Приликом третирања треба поштовати водозащитне зоне и спречити контаминацију површинских вода, (водотоци, језера), дренажних система, отворених одводних система или места где је могуће сливање кише са третираних површина у површинске воде третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

**КАРЕНЦА** (време између последње примене пестицида пре бербе, односно жетве): 35 дана за пшеницу.

**РАДНА КАРЕНЦА** (време у коме није дозвољен рад у пољу и заштићеном простору после примене): 24 часа.

## ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

Обавештења о опасности:	H315 H319 H335 H410	Изазива иритацију коже. Доводи до јаке иритације ока. Може да изазове иритацију респираторних органа. Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.
Додатно обавештење о опасности:	EUN401	Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.
Обавештења о мерама предострожности – превенција:	P261 P280 P273	Избегавати удисање прашине / дима / гаса / магле / пара / спреја. Носити заштитне рукавице / заштитну одећу / заштиту за очи / заштиту за лице. Избегавати испуштање / ослобађање у животну средину.
Обавештења о мерама предострожности – реаговање:	P302 + P352 P304+P340 P305+P351 +P338 P312	АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Испрати са доста воде. АКО СЕ УДАХНЕ: Изнети особу на свеж ваздух и ставити је у положај који олакшава дисање. АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА или лекара ако се не осећате добро.
Обавештења о мерама предострожности – складиштење:	P403+P233	Чувати у просторији са добром вентилацијом. Амбалажу чврсто затворити.
Обавештење о мерама предострожности – одлагање:	P501	Одлагање садржаја / амбалаже у складу са националним прописима.
Опште додатне ознаке безбедности: (proveriti)	SP1	-Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. -Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. -Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

Spo2	- После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.
Spe3	- Због заштите водених организама треба поштовати зоне безбедности од 20 m до водене површине

### **СИМПТОМИ И ЗНАЦИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ**

Могу се јавити следећи општи симптоми: мука, гађење, малаксалост, главобоља, а некада и повраћање. Ако се удише доводи до иритације са сувим, наддражајним кашљем. Препарат у додиру са кожом изазива црвенило и свраб, а у контакту са очима црвенило, сузење и бол у очима.

**Удисање:** Ако се након удисања испарења препарата појаве тегобе, изнети експонирану особу на чист ваздух, а након тога потражити савет лекара. **Контакт са кожом:** Након контаминације коже неопходно је одмах скинути евентуално контаминирану одећу и кожу обилно опрати водом. Одмах се обратити лекару. Контаминирану одећу пре поновне употребе треба опрати. **Контакт са очима:** Ако препарат доспе у очи неопходно је обилно испирање водом у трајању од 15-так минута (уз отворене очне капке), а након тога се обратити лекару. **Гутање:** Ако је препарат прогутан попити једну до две чаше воде. Не изазивати повраћање. Уколико је особа без свести не давати јој ништа. Одмах се обратити лекару.

Лекар по потреби консултује:

**ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА**

Национални центар за контролу тровања

Црнотравска 17, Београд

Дежурни телефон: (24 часа дневно): 011 360 84 40

### **ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И ПОСТУПЦИ**

Користити одговарајућу заштитну опрему, заштитно одело са рукавима и дугачким ногавицама и хемијски резистентне чизаме и рукавице, као и заштиту за очи/лице. За време рада се не сме јести, пити нити пушити. После завршетка рада руке и лице добро опрати водом и сапуном и истуширати се.

### **ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**

Уколико је дошло до неконтролисаног ослобађања великих количина препарата (при транспорту, складиштењу, итд) неопходно је уз примену одговарајуће заштитне опреме (заштитне одеће, наочара, респиратора) покупити препарат и сместити га у затворене контејнере. Контаминирану површину је неопходно одмах опрати 5% раствором амонијака. Након тога покупити материјал у затворену посуду и одложити у складу са локалном законском регулативом.

### **РУКОВАЊЕ ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ**

Испражњену амбалажу испрати поступком троструког испирања или поступком испирања под притиском. Поступак троструког испирања: 1) садржај амбалаже испразнити у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди; 2) додати воду до 1/3 запремине амбалаже; 3) амбалажу затворити и садржај снажно промућкати; 4) садржај амбалаже сипати у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди. Поступак поновити два пута. Тачност од испирања (испирак) сипати у резервоар уређаја за примену. Испрану амбалажу пробушити на три места и тако је учинити неупотребљивом. **Забрањено је поново користити амбалажу средства за заштиту биља или ту амбалажу користити у неке друге сврхе!** Са испражњеном амбалажом поступити у складу са прописима којима се уређује амбалажа и амбалажни отпад.

### **СКЛАДИШТЕЊЕ**

Препарат чувати на температурама од 0 °C до 30 °C у добро затвореној, оригиналној амбалажи на тамном и проветреном месту, далеко од директне сунчеве светлости и извора топлоте, ван дохвата деце и одвојено од хране, пића, сточне хране и предмета опште употребе.

### **ЧИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ**

Не чистити уређаје за примену у близини водених површина и водотокова. Одмах после примене потпуно испразнити уређај за примену. Добро испрати резервоар, крила и дизне чистом водом. Воду од чишћење утרוшити на површини на којој је третман извршен.

**НАПОМЕНА КОРИСНИКУ**

**RESORT** се мора користити само према препорукама из овог упутства за употребу. Произвођач неће бити одговоран за губитке или штете изазване неправилном употребом овог производа. Корисник преузима сав ризик у случају непрепоручене примене.

**Дозвола за стављање у промет:** Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 321-01-932/2022-11 од 30.03.2023. године.

**Произвођач:** Sharda Cropchem Ltd, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400056 Mumbai – India.

**Заступник:** ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 11030 Београд, Србија.

**Величина паковања у промету:** 1 l, 5 l, 25 l и 200 l.

**Рок трајања:** 2 године у условима правилног складиштења у оригиналном неотвореном и неоштећеном паковању. **Датум производње и број шарже** су утиснути на паковању.