FERROCIOUS

Лимацид - средство за сузбијање штетних пужева
гранулирани мамак (GB)

САСТАВ ПРЕПАРАТА (активна супстанца):

Генерички назив:
Хемијски назив (IUPAC): Ferric phosphate
Садржај: 29,7 ± 7,4 g/kg
Техничка чистоћа: min 703 g/kg (260 g/kg гвожђа и 144 g/kg фосфора)
CAS број: 10045-86-0

Пре примене средства за заштиту биља обавезно прочитати етикету!

ДЕЛОВАЊЕ
FERROCIOUS је молускоцид са контактним и дигестивним деловањем за употребу у **повртњацима, ратарским културама, виновој лози и у воћарским културама за сузбијање пужева и пужева голаћа.**

ПРИМЕНА
FERROCIOUS се примењује у количини од 7 kg/ha (70 g/100 m^2). У воћарским културама применити након почетка вегетације, и у каснијем периоду вегетације, до фазе када готово сви плодови достигну коначну величину типичну за дату врсту (BBCH 79); у виновој лози средство применити након почетка вегетације или након садње у каснијем периоду вегетације, до почетка зрења бобица (бобице почињу да мењају боју, фаза 81 BBCH скале); у повртарским културама средство применити након почетка вегетације или након садње у каснијим фазама вегетације, до фазе када део гајене биљке намењене за бербу достигну типичну величину и облик (BBCH 49); у ратарству применити средство након сетве у каснијем периоду вегетације, до фазе потпуне зрелости семена (BBCH 89).

Начин примене: Уједначеним расипањем по целој површини земљишта, око биљака, ручно или помоћу уређаја растурање гранула, водећи рачуна да грануле не остану на деловима биљака. Максималан број третирања: Четири пута на истој површини у току једне вегетације. Интервал између третирања је 14 дана.

Напомена за примену: Мамце треба поставити тако да се минимализује ризик да их конзумирају друге животиње. У циљу заштите усева од напада штеточина придржавати се ограничења дозе примене.
Начин деловања и време примене:
Након гутања производа, виноградарски пуж и пужеви голаћи престају да се хране и излучују секрет у биљке. Нема потребе сакупљати угинуле пужеве, јер након што прогутају грануле, они одлазе на изолована места да угину.

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ
FERROCIOUS се примењује директно на земљиште. Не меша се са водом.

МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ ПЕСТИЦИДИМА
Употребљава се самостално.

ЗАНОШЕЊЕ
Спречити доспевање препарата изван жељене површине и на водотокове и друге водене површине.

РЕЗИСТЕНТНОСТ

С обзиром на механизам деловања, није утврђена појава резистентности. Средство се не класификује у једну или више класа и категорија опасности.

ФИТОТОКСИЧНОСТ
Уколико је примењен према препорукама датим у овом упутству за употребу и у препорученим количинама, производ није фитотоксичан.

НАПОМЕНЕ И ПРЕПОРУКЕ
- Средство постиже најбољи ефекат у заштити једногодишњих биљака када се примени непосредно након садње/сетве
- Највиша ефикасност постиже се када се третман изврши пре појаве штете.
- Средство се не сме примењивати заједно са ђубривом.

Негативно деловање средства за заштиту биља на воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, језера, изворишта вода и бунара), третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

КАРЕНЦА (време између последње примене препарата и бербе, односно жетве): -

РАДНА КАРЕНЦА (време у којем није дозвољен рад у пољу и заштићеном простору после примене средства за заштиту биља): -

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

Обавештења о мерама предострожности – превенција:	P 280	Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/заштитне наочаре/заштиту за лице
Обавештења о мерама предострожности – одлагање:	P501	Одлагање садржаја / амбалаже у складу са националним прописима.
Додатно обавештење о опасности:	EUH401	Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.
Опште додатне ознаке безбедности:	SP 1	Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом.
	SPo 2	Опрему за наношење средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева. После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

СИМПТОМИ И ЗНАЦИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ
Симптоми и знаци тровања укључују мучнину, грчеве у трбуху, повраћање, црвенило коже лица, атаксију, хиперрефлексију, а при масивним ингестијама је могућа и појава конвулзија метаболичке ацидозе, коме, престанка дисања и смрти.
У случају да средство доспе у организам:
- перорално (гутањем) – испрати уста, консултовати лекара.
- перкутано (додир са кожом), уклонити контаминирану одећу и опрати контаминиране делове тела сапуном и већом количином воде. Консултовати лекара ако је потребно.
- у случају додира са очима испрати одмах са већом количином воде. Консултовати лекара ако је потребно.

Лечење је симптоматско, нема специфичног антидота.

У случају сумње на тровање обратити се лекару. При обраћању лекару обавезно приложите паковање или етикету производа. Лекар по потреби консултује:

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
Национални центар за контролу тровања
Црнотравска 17, Београд
Дежурни телефон: (24 часа дневно): 011 360 84 40

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И ПОСТУПЦИ
Обавезно је ношење заштитних рукавица и заштитну одећу. При раду са препаратом се треба придржавати општих мера хигијенско-техничке заштите. Пазити да средство не доспе у очи. Током рада не јести, пити ни пушити. Избегавати непотребан контакт са средством. Неправилна употреба средства може проузроковати штету по здравље.

ПОСТУПАЊУ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Уколико је дошло до неконтролисаног испуштања великих количина препарата неопходно је уз примену одговарајуће заштитне опреме покупити препарат и сместити га у затворене контејнере. Препарат који је просут ван места употребе треба покупити и као такав складиштити у судове, док се не обезбеди дефинитивно одлагање тог отпада у складу са прописима.

СКЛАДИШТЕЊЕ
Чувати под кључем, ван домашаја деце, у добро затвореним, оригиналним посудама, на сувом месту са добром вентилацијом, изван места становања, одвојено од хране, пића и сточне хране и не на директној сунчевој светлости. Чувати на температури од 0 – 30°C.

РУКОВАЊЕ ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ
Испражњену амбалажу потребно је снажно протрести да би што мањи садржај средства за заштиту биља заостао у амбалажи и потом је испрати. Течност од испирања (испирак) сипа се у резервоар уређаја за примену. **Забрањено је поново користити амбалажу средства за заштиту биља или ту амбалажу користити у неке друге сврхе!** Са испражњеном амбалажом поступити у складу са прописима којима се уређује амбалажа и амбалажни отпад.

НАПОМЕНА КОРИСНИКУ
FERROCIOUS се мора користити само према препорукама из овог упутства за употребу. Произвођач неће бити одговоран за губитке или штете изазване неправилном употребом овог производа.
Корисник преузима сав ризик у случају непрепоручене примене.

Дозвола за стављање у промет: Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије број: 000755038 2026 14842 003 000 321 05 од 09.06.2026. године.

Произвођач: Sharda Cropchem Ltd, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400056 Mumbai – India.

Заступник: ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 11030 Београд, Србија.

Величина паковања у промету: 250 g, 500 g, 1,75 kg, 3,5 kg, 5 kg, 10 kg

Рок трајања: 2 године у условима правилног складиштења у оригиналном неотвореном и неоштећеном паковању. **Датум производње и број шарже** су утиснути на паковању.